


# **Réfléchir la taille pour pérenniser la vigne**


# Constat

Beaucoup de bois mort dans les ceps sains




SICAVAC

# Raisons




# Conséquences d'une plaie de taille



Tronc de 7 ans


# Moyens de remédier au problème : équilibrer la taille




# Moyens de remédier au problème :

## 3 types de coupes


Branche de l'année



Branche de 2 ans ou plus



Tronc principal



SICAVAC

# Moyens de remédier au problème : branche de l'année

**Ne pas supprimer  
l'empattement**



**Trop ras**




**Trop long**




**Correct**


# Moyens de remédier au problème : branche secondaire de 2 ans ou plus



# Moyens de remédier au problème : coupe d'une branche principale



# Moyens de remédier au problème : coupe d'une branche principale




**$D < 2 \text{ à } 3 d$  : pas de mur 4**  
 **$L > 2D$**


# Moyens de remédier au problème :

## 3 types de coupes


Branche de l'année



Branche de 2 ans ou plus




Tronc principal



SICAVAC

# Taille de la vigne



SICAVAC

# Taille de la vigne



SICAVAC

# Taille de la vigne



SICAVAC

# Taille de la vigne



SICAVAC

# Taille de la vigne



SICAVAC


# Taille de la vigne



SICAVAC

# Formation du guyot : première feuille

Ébourgeonner en ne laissant qu'une branche




Pied non ébourgeonné  
Nombreuses plaies de taille

Pied ébourgeonné à une branche  
Aucune plaie de taille

# Formation du guyot : première feuille

Adapter la charge à la vigueur dès la première année





Ébourgeonner correctement en ne conservant que les sarments des yeux francs

Si la vigueur est normale, il est possible de ne garder qu'un seul sarment

# Formation du guyot : année suivante

1<sup>e</sup> cas



Attache  
au fil



Adapter la charge à la  
vigueur



Laisser des chicots  
même sur bois d'un an

2<sup>e</sup> cas




2e cas : essayer  
d'orienter les yeux  
dans le sens du rang

# Formation du guyot : année suivante



Laisser des chicots si des sarments sont éliminés sous le courson


# Formation du guyot : année suivante




Conserver du bois des deux côtés du cep

Alterner la baguette

## Aller plus loin: réfléchir la position des yeux



## Aller plus loin: respecter les flux de sève




## Aller plus loin: respecter les flux de sève



Flux de sève  
inversé



# Principes de la taille Guyot Poussard




- Deux bras
  - Un avec un courson
  - Un avec courson + baguette
- Alternier la baguette chaque année
- Mettre le courson sous la baguette


# Intérêts de la taille Guyot Poussard

- Conservation de l'équilibre du cep d'année en année,
- Toutes les plaies de taille sont réalisées du même côté de la charpente,
  - Un côté « sacrifié »,
  - Un côté totalement préservé,
- Mortalité fortement diminuée.

# Formation et conduite du Guyot-Poussard



**Former les bras en supprimant les 1<sup>ers</sup> yeux du courson et de la baguette**





SICAVAC

# Taille de la vigne

